

HIPRASUIS GLÄSSER

Vacuna inactivada, E. Glässer, en suspensión inyectable

COMPOSICIÓN:

Haemophilus parasuis inactivado serotipo SV1; *Haemophilus parasuis* inactivado serotipo SV6.

En los últimos años, uno de los procesos bacterianos de mayor relevancia en el ganado porcino han sido las infecciones por microorganismos del género *Haemophilus* sp. Dentro de este grupo, *Haemophilus parasuis* es el agente etiológico de la enfermedad de Glässer, que puede afectar a cerdos de distintas edades y pesos.

Sin embargo, la mayor incidencia se da en animales en la fase de posdestete y primeras semanas de cebo.

Después de numerosos estudios científicos realizados en nuestro Laboratorio de Diagnósticos a partir de animales con graves procesos clínicos de origen bacteriano, debidos a *Haemophilus parasuis*, se ha llegado al diseño de una vacuna en la que se engloban los dos serotipos más convenientes en la prevención de la enfermedad de Glässer, patología que clínicamente se caracteriza por producir artritis, poliserositis y, esporádicamente, meningitis, en cerdos afectados. Estos dos serotipos, debidamente inactivados y adyuvantados, si son aplicados correctamente, producen un elevado efecto inmunógeno.

INDICACIONES:

Cerdos: Prevención de la Enfermedad de Glässer.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular, en los músculos del cuello.

POSOLÓGÍA:

Cerdos: 2 ml/cerdo, independientemente de su peso, edad y sexo.

En general, es aconsejable el siguiente programa vacunal orientativo:

Cerdas: Vacunación de todo el efectivo, revacunando 3 semanas más tarde. Aplicar una dosis de recuerdo cada 6 meses.

Lechones y Cerdos destetados: Vacunación a las 3-4 semanas de edad, revacunando 3 semanas después.

TIEMPO DE ESPERA:

0 días.

OBSERVACIONES:

- Puede administrarse en cualquier momento durante la gestación y lactación de las cerdas.

- Puede aparecer una reacción anafiláctica esporádica en algún animal sensibilizado. En este caso, administrar un antihistamínico.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

- Administrar la vacuna cuando esté a temperatura ambiente de unos +15 a +25 °C.

- Agitar antes de usar.

- Guardar entre +2 y +8 °C, evitando su posible congelación.

PRESENTACIÓN:

Frasco 50 ds.

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria

USO VETERINARIO

HIPRASUIS GLÄSSER

Inactivated vaccine, Glässer's disease, in injectable suspension

COMPOSITION:

Inactivated *Haemophilus parasuis* serotype SV1; Inactivated *Haemophilus parasuis* serotype SV6.

Over the last years, one of the most important bacterial processes in swine have been infections produced by the microorganisms of the genus *Haemophilus* sp. In this group, *Haemophilus parasuis* is the aetiological agent of Glässer's disease. This disease can affect pigs of various weights and ages, but it mainly affects animals in the postweaning period or during the first weeks of the fattening period.

After many scientific studies performed in our laboratory, we have developed a vaccine which includes the two most important serotypes for the prevention of Glässer's disease. The disease is clinically characterized by producing arthritis, polyserositis and occasionally meningitis in affected pigs. These two serotypes, duly inactivated and adjuvanted, if properly applied, produce a high immunogenic response.

INDICATIONS:

Swine: To prevent Glässer's disease.

ADMINISTRATION ROUTE:

Intramuscular, into the neck muscles.

DOSAGE:

Swine: 2 ml/pig, for all weights, ages and sex.

Generally, the following vaccination programme is recommended:

Sows: Vaccination of the whole group and revaccination 3 weeks later. Apply a booster vaccination every 6 months.

Piglets and Weaned pigs: Vaccination when 3 to 4 weeks old and revaccination 3 weeks later.

WITHDRAWAL PERIOD:

0 days.

OBSERVATIONS:

- It can be administered at any time during the gestation and lactating periods.

- A sporadic anaphylactic reaction may appear in some sensitive animals. In such a case administer an antihistaminic.

SPECIAL PRECAUTIONS:

- It is advisable to administer the vaccine at a temperature between +15 and +25 °C.

- Shake before use.

- Store at +2 to +8 °C, avoiding freezing.

PRESENTATION:

50 ds bottle.

Under veterinary prescription

FOR VETERINARY USE ONLY



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com