

MYPRAVAC SUIS

Vacuna inactivada, Neumonía Enzoótica, en suspensión inyectable

COMPOSICIÓN POR DOSIS (2 ml):

Mycoplasma hyopneumoniae Inactivado ≥ 50 AMU.

INDICACIONES:

Cerdos: Inmunización activa de lechones para prevenir la Neumonía enzoótica Porcina a partir de los 7-10 días de edad.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vacunar mediante inyección intramuscular profunda en los músculos del cuello, en la zona cervical lateral detrás de la oreja. Se recomienda que las dosis vacunales se administren en zonas alternas.

POSOLOGÍA:

Granjas con una elevada incidencia de Neumonía enzoótica: Administrar una dosis de 2 ml por animal a los 7-10 días de edad. Esta dosis de 2 ml debe repetirse 21 días más tarde.

Granjas con una baja incidencia de Neumonía enzoótica: Administrar una sola dosis de 2 ml por animal a partir de las 5 semanas de edad.

Se recomienda atemperar la vacuna entre +15 °C y + 25 °C antes de su administración.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar a animales enfermos.

REACCIONES ADVERSAS:

Como en todos los animales vacunados, pueden producirse reacciones aisladas de hipersensibilidad, así como reacciones locales en el punto de inoculación que remiten a los pocos días.

GESTACIÓN Y LACTACIÓN:

La vacuna no está indicada para ser utilizada durante la gestación o la lactación.

TIEMPO DE ESPERA:

Carne: 2 días

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Agitar antes de usar.

Guardar entre +2 y +8 °C, evitando su posible congelación.

PRESENTACIÓN:

Frasco 10 ds

Frasco 50 ds

Envase 10 frascos de 10 ds.

Prescripción veterinaria
PARA USO VETERINARIO

MYPRAVAC SUIS

Inactivated vaccine against Enzootic Pneumonia, in injectable suspension

COMPOSITION PER DOSE (2 ml):

Mycoplasma hyopneumoniae Inactivated ≥ 50 AMU.

INDICATIONS:

Pigs: Active immunisation of piglets to prevent Enzootic Pneumonia from 7-10 days of age.

ADMINISTRATION ROUTE:

Vaccinate by deep intramuscular injection into the neck muscles, in the lateral cervical area behind the ear. It is advisable to alternate the areas in which the two vaccinal doses are administrated.

DOSAGE:

Farms with a high incidence of Enzootic Pneumonia: Administer one dose of 2 ml/animal from 7 to 10 days of age. This 2 ml dose should be repeated after 21 days.

Farms with a low incidence of Enzootic Pneumonia: Administration of a unique dose of 2 ml/animal at 5 weeks of age.

It is recommended that the vaccine should be allowed to warm to a temperature of between +15 °C and +25 °C before administration.

CONTRAINDICATIONS:

Do not administer to diseased animals.

ADVERSE REACTIONS:

Occasionally anaphylactic reactions may occur in some sensitive animals.

Long-lasting microscopic lesions may be detected at the inoculation site after vaccination.

PREGNANCY AND LACTATION:

The vaccine is not indicated for use during pregnancy or lactation.

WITHDRAWAL PERIOD:

Meat: 2 days.

SPECIAL PRECAUTIONS:

Shake before use.

Store between +2 to 8 °C, avoiding freezing.

PRESENTATION:

Vial of 10 ds

Bottle of 50 ds

Box of 10 vials of 10 ds.

Under veterinary prescription
FOR VETERINARY USE ONLY



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com

76116-01.0

10-12



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com