

SUIPRAVAC PRRS

Vacuna inactivada contra los procesos reproductivos del Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRRS), en emulsión inyectable

COMPOSICIÓN:

Virus inactivado PRRS.

A finales del año 1990 apareció por primera vez en Europa un nuevo síndrome en el ganado porcino que en un principio, y debido a sus manifestaciones, se le dieron diversos nombres: Enfermedad misteriosa, Enfermedad azul del cerdo, Enfermedad de las orejas azules, etc. Últimamente, ha sido universalmente aceptado el nombre PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome), puesto que es el que define más claramente sus manifestaciones clínicas.

LABORATORIOS HIPRA, S.A. ha preparado una vacuna inactivada a fin de proteger las cerdas reproductoras frente a dicho síndrome.

INDICACIONES:

Cerdas: Prevención de los procesos reproductivos de la cerda producidos por el virus PRRS.

DOSIS:

Cerdas: 2 ml independientemente del peso y edad.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular profunda en los músculos del cuello detrás de la base de la oreja.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Cerdas reproductoras (en gestación o lactación): Recibirán 2 vacunaciones de 2 ml en un intervalo de 3-4 semanas. Luego, cada 4 meses, se aplicará una dosis de recuerdo o una dosis en cada lactación. No deben vacunarse las cerdas 8-10 días antes y después de la cubrición para evitar anomalías en el celo y en la nidación de los óvulos.

Cerdas de reposición: Recibirán 2 vacunaciones de 2 ml en un intervalo de unas 3 semanas al entrar en la explotación. Luego se seguirá el mismo plan vacunal de las cerdas reproductoras.

TIEMPO DE ESPERA:

0 días.

PRECAUCIONES:

- Vacunar únicamente animales sanos.
- En caso de aparecer reacciones alérgicas, administrar epinefrina.
- Evitar la inoculación de la vacuna en el tejido subcutáneo.
- Guardar entre +2 y +8 °C y al abrigo de la luz. Agitar antes de usar.
- Una vez empeñado el frasco, usar ininterrumpidamente.
- Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes.

ADVERTENCIAS ESPECIALES:

Advertencias para el usuario:

Este producto contiene un aceite mineral. Su inyección accidental (autoinyección) puede provocar dolor agudo e inflamación, especialmente si se inyecta en una articulación o en un dedo y, ocasionalmente, podría provocar la pérdida del dedo afectado si no se proporciona con urgencia atención médica.

En caso de inyectarse accidentalmente este producto, busque urgentemente atención médica, incluso si se ha inyectado una cantidad muy pequeña y lleve el prospecto consigo.

Si el dolor persiste más de 12 horas después del examen médico, solicite de nuevo atención médica.

Advertencias para el médico:

Este producto contiene un aceite mineral. Incluso si se han inyectado pequeñas cantidades, la inyección accidental de este producto puede causar una inflamación intensa, que podría ocasionar una necrosis isquémica e, incluso la pérdida del dedo. Es necesaria la atención médica experta e INMEDIATA, y puede ser preciso practicar tempranamente una incisión e irrigar la zona, especialmente si está afectada la yema del dedo o un tendón.

PRESENTACIÓN:

Envase 10 fr de 10 ds.

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria
USO VETERINARIO

SUIPRAVAC PRRS

Inactivated vaccine against reproductive processes of the Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS), in injectable emulsion

COMPOSITION:

Inactivated PRRS virus.

By the end of 1990, a new porcine syndrome appeared for the first time in Europe. At the beginning, due to its clinical signs, the new syndrome was given different names such as: mystery disease, blue ear disease, etc. Currently, it is universally known as PRRS (Porcine reproductive and respiratory syndrome), which best defines the disease.

LABORATORIOS HIPRA, S.A. has developed an inactivated vaccine to protect breeding sows against this syndrome.

INDICATIONS:

Sows: Prevention of the reproductive processes of sows caused by the PRRS virus.

DOSAGE:

Sows: 2 ml for all weights and ages.

ADMINISTRATION ROUTE:

Deep intramuscular in the neck muscles behind the base of the ear.

VACCINATION PROGRAMME:

Breeder sows (gestating or lactating): Are to receive two 2-ml vaccinations at an interval of 3 to 4 weeks. A booster dose must then be applied every 4 months or a dose at each lactation. Sows must not be vaccinated 8-10 days before or after mating so as not to cause anomalies in the period of heat and in the embedding of ovules.

Breeder sows: Are to receive two 2-ml vaccinations at a 3-week interval upon entering the farm. They are then to follow the same vaccinal schedule as the breeder sows.

WITHDRAWAL PERIOD:

0 days.

PRECAUTIONS:

- Vaccinate only healthy animals.
- In the event allergic reactions occur, administer epinephrine.
- Avoid inoculating the vaccine in subcutaneous tissue.
- Store at +2 to +8 °C, protected from light. Shake before use.
- Once the bottle has been opened, use uninterrupted.
- All unused veterinary medicament and any waste products deriving from it must be disposed of in accordance with the current regulations.

SPECIAL WARNING:

Warnings for the user:

This product contains mineral oil. Accidental injection (self-injection) may result in severe pain and swelling, particularly if injected into a joint or finger, and in rare cases could result in the loss of the affected finger if prompt medical attention is not given.

If you are accidentally injected with this product, seek prompt medical advice even if only a very small amount is injected and take the package leaflet with you.

If pain persists for more than 12 hours after medical examination, seek medical advice again.

Warnings for the doctor:

This product contains mineral oil. Even if small amounts have been injected, accidental injection with this product can cause intense swelling, which may, for example, results in ischemic necrosis and even the loss of a digit. PROMPT expert, surgical attention is required and may necessitate early incision and irrigation of the injected area, especially where finger pulp or tendon is involved.

PRESENTATION:

Box with 10 vials of 10 ds.

Under veterinary prescription
FOR VETERINARY USE ONLY



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com

71252-10

05-17



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com